

### Contact :

BP 238, Tambacounda, Sénégal  
 Tel : 339811562 – 774515138  
[conservateur.boundou@gmail.com](mailto:conservateur.boundou@gmail.com)  
[environnement.tamba@gmail.com](mailto:environnement.tamba@gmail.com)

En partenariat avec :



**Conception et réalisation :** Gabriel Caucanas et Abdou Diouf

**Crédits photographiques :** Gabriel Caucanas, Dimitri Dagorne, Jean Delannoy, Valentin Motteau, Bram Piot, Thibault Rivière

Les Oiseaux faciles à observer de la

## Réserve Naturelle Communautaire du Boundou



**Conservatoire de la Réserve Naturelle  
 Communautaire du Boundou (CORENA-2018)**

La Réserve Naturelle Communautaire (RNC) du Boundou est une aire protégée à l'est de Tambacounda, gérée par et pour les communautés des quatre communes de Dougué, Koussan, Sinthiou Fissa et Toumboura. Le Conservatoire de la RNC du Boundou (CORENA) développe des outils pédagogiques en partenariat avec les écogardes et écoguides, les enseignants et l'ensemble des habitants de ce territoire peu connu.

Jusqu'en août 2018, 270 espèces d'oiseaux ont été observées dans la RNC du Boundou. Ce document en présente 81 des plus communes et facilement observables avec des critères simples d'identification pour aider à les différencier. Il n'est donc pas exhaustif mais représente un atout dans l'initiation à l'ornithologie dans le Boundou.

Les oiseaux sont des animaux à plumes. La couleur d'un oiseau dépend de la couleur de chacune des plumes qui le recouvrent. Tout au long de sa vie, un oiseau perd régulièrement ses plumes usées pour les remplacer par des nouvelles fraîches. On parle de mue. La couleur d'un oiseau peut donc varier au cours de sa vie. En fonction de l'âge et du sexe de l'oiseau, il peut présenter des plumages différents. Dans ce document, seuls les plumages typiques ou les plus fréquents sont représentés.

La plupart des oiseaux présentés ici sont observables toute l'année dans le Boundou. On dit qu'ils sont sédentaires. Cependant, près de la moitié des espèces répertoriées dans la RNC du Boundou fait référence à des espèces migratrices, qui ne passent qu'une partie de l'année chez nous.

Le matin et le soir sont les meilleurs moments pour observer les oiseaux. L'eau étant un élément essentiel des écosystèmes et dans la vie des oiseaux, il est préférable de se rapprocher des points d'eau pour les observer, notamment en saison sèche.

### Le saviez-vous ?

Les tisserins sont nommés ainsi car ils construisent des nids tissés à l'aide de débris végétaux. Le mâle tisse son nid et parade pour attirer une femelle qui choisira de s'installer dans le nid s'il lui convient. Ces oiseaux sont grégaires et nichent en colonie. Un même mâle peut construire jusqu'à cinq nids différents et s'accoupler avec cinq femelles différentes dans la même colonie. Il est polygame. Les colonies s'installent dans les grands arbres souvent dans les villages ou au-dessus de l'eau pour éviter les prédateurs. Une fois l'hivernage terminé, le mâle perd la coloration noire de sa tête, on dit qu'il mue.

### Tisserin gendarme

Tête noire chez le mâle ; nuque brune ; œil rouge

Corps, ailes et queue jaune éclatant



Tête jaune chez la femelle ; bec clair et œil sombre

# Près des troupeaux

### Pique-bœufs

Bec jaune à pointe rouge

Dos brun et queue bifide



### Piapiac africain

Dominante noire mais bout des ailes blanchâtre en vol

Bec robuste noir chez l'adulte (et rouge à pointe noire chez le jeune)



Longue queue pointue

### Rollier d'Abyssinie

Dos brun



Longue queue (plus d'une fois la taille du corps) terminée par deux grandes plumes

Corps et tête bleu-ciel

### Héron garde-bœufs

Corps entièrement blanc



Bec et pattes jaunes



# Pigeons et

Pigeon roussard

Œil et masque rouge  
 Marques blanches sur les ailes sombres  
 Cou rouge



Pigeon domestique

Couleur et motifs variables (blanc, marron, gris, noir...)  
 Contour de l'œil rouge



Tourtelette d'Abyssinie

Taches bleues sur les ailes brunes  
 Tête bleutée et front blanchâtre



Petite taille

Tourterelle masquée

Masque noir et bec jaune à base rouge chez le mâle  
 Tête et bec gris chez la femelle



Longue queue sombre

# tourterelles

## Le saviez-vous ?

La Tourterelle des bois est un oiseau migrateur, c'est-à-dire qu'elle n'est présente qu'une partie de l'année au Sénégal (d'octobre à mars). En avril, elle entreprend un long voyage à travers le Sahara et la Méditerranée pour rejoindre les campagnes d'Europe occidentale. Là-bas, elle se reproduira jusqu'au mois d'août. En Septembre, elle reprendra la route en sens inverse pour revenir par chez nous. **Elle est aujourd'hui menacée** car elle est chassée et son habitat et sa nourriture disparaissent petit à petit. **Protégeons-la !**

Tourterelle des bois

Œil rouge  
 Taches noires et blanches sur les côtés du cou



Ailes orangées à taches sombres

Tourterelle pleureuse

Œil rouge et tête gris-bleutée



Corps majoritairement gris-crème

Tourterelle vineuse

Demi-collier noir entouré de blanc



Œil sombre

Taches à l'avant du cou

Tourterelle maillée

Corps majoritairement roux, ailes grises



Cou et ventre rosés

# Les petits

## Amarante du Sénégal

Mâle à dominante rouge,  
Femelle à dominante beige

Ailes et queue brunes



Bec rose ; œil sombre entouré  
d'un cercle jaune

## Cordonbleu à joues rouges

Dessus de la tête et ailes bruns

Tache rouge sur la joue  
chez le mâle uniquement




Dominante bleue ; bec rose

## Moineau gris

Bec et contour de l'œil sombres

Ailes et queue brunes




Dominante grise

## Petit moineau

Bec clair et long sourcil blanc chez la femelle

Longue bande brune en  
arrière de l'œil



Dominante beige

## Moineau doré

Ailes brunes  
marquées de blanc



Mâle à dominante jaune or,  
Femelle à dominante jaune pâle

# passereaux

## Le saviez-vous ?

Les passereaux sont des petits oiseaux chanteurs. Les mâles ont en général un plumage plus coloré en période de reproduction pour attirer les femelles, plus ternes. Cependant, lorsque la reproduction est finie, les mâles perdent souvent leur plumage coloré pour ressembler aux femelles et moins attirer l'attention des prédateurs. Il est alors très difficile de discerner les deux sexes.

## Combassou du Sénégal

Mâle

Corps entièrement  
noir brillant ; bec blanc



Pattes rouges

Femelle

Dominante beige ;  
bandes horizontales  
brunes sur la tête ;  
taches noires sur les  
ailes et le dos



## Euplecte franciscain

Mâle

Dessus de la tête,  
joues et ventre noirs



Queue, cou et dos  
rouges

Femelle

Bec couleur chair, sourcil  
jaune pâle marqué ; dessus  
de la tête tacheté de noir



Corps couleur beige ;  
poitrine striée


## Travailleur à bec rouge

Dos, ailes et queue  
tachetées de noir



Corps gris à roux  
selon les individus ;  
poitrine sans strie

Bec rouge ; tête grise  
chez la femelle



Bec rouge ; masque  
noir chez le mâle




# Dans les arbres,

# en savane plutôt ouverte

Perroquet youyou




Perruche à collier




Touraco gris




Bulbul des jardins



Calao occidental




Calao à bec noir



Longue queue

Choucador à longue queue



Choucador à oreillons bleus



Choucador pourpré




Corps majoritairement bleu verdâtre

Queue courte

Corps bleu-violet

## Dans les arbres,


Coucal du Sénégal



Dos brun  
Tête noire et œil rouge

Ventre, gorge et joues pales


Gonolek de Barbarie



Corps et bec noirs  
Dessus de la tête jaune

Ventre rouge

Cratérope brun



Bec noir pointu  
Œil orange  
Dos brun

Tête grise

Ventre pale

Irrisor moqueur

Corps entièrement vert-violet sombre ;  
lignes blanches sur les ailes lorsque  
l'oiseau vole



Long bec rouge pointu et  
légèrement recourbé

Longue queue noire à taches blanches

## en savane plutôt ouverte

Drongo brillant




Dominante noire  
Œil rouge

Queue échancrée

Lorsque le drongo vole, une tache blanche est  
visible au bout de chacune des deux ailes.


Corvinelle à bec jaune



Bec jaune  
Corps brun, ventre gris

Longue queue  
brune

Souïmanga à longue queue




Dominante verte  
Bec sombre et recourbé

Queue courte terminée  
par deux longues  
plumes sombres

Dos brun et ventre  
jaune pâle chez la  
femelle

Souïmanga à poitrine rouge



Tête bleutée  
Dominante brun-sombre  
(femelle entièrement brune)

Poitrine rouge chez  
le mâle

Queue courte

### Le saviez-vous ?

Les souïmangas se nourrissent du nectar des fleurs des arbres et participent à leur reproduction. Comme certaines chauves-souris, ils permettent la production de nombreux fruits, notamment de baobab.



# Les oiseaux

Francolin à double éperon

Bec entièrement jaune

Sourcil blanc marqué



Corps pâle fortement strié de brun

Pattes jaune-verdâtre

Poulette de roche

Huppe et queue souvent levées

Bec et contour de l'œil rouges



Corps brun moucheté de blanc (peu visible de loin)

Pattes rouges

Ædicnème du Sénégal

Long bec majoritairement noir

Contour de l'œil jaune



Longues pattes jaunes

Ventre blanc

Pintade de Numidie

Tête nue bleue avec deux excroissances rouges et surmontée d'un petit casque couleur chair



Corps gris-sombre moucheté de blanc

# souvent au sol

Vanneau éperonné

Joues blanches et poitrine noire ; absence de huppe



Bec et pattes noirs

Vanneau à tête noire

Joues noires et poitrine blanche ; présence d'une huppe



Bec et pattes rouge-sombre

Vanneau du Sénégal

Joues et poitrine grises ; absence de huppe



Bec et pattes jaunes

Bucorve d'Abyssinie

Rouge sur la gorge chez le mâle uniquement, bleue chez la femelle et le jeune ; peau bleue autour de l'œil, casque grisâtre

## Le saviez-vous ?

Le bucorve est l'un des oiseaux volants les plus lourds au monde. Il est également remarquable pour ses qualités parentales. Le couple est fidèle toute sa vie et s'occupe de chaque jeune pendant plus d'un an, ce qui est exceptionnel chez les oiseaux. Bien qu'il soit très souvent à terre, le bucorve fait son nid dans les grands arbres creux. L'abattage des grands arbres est donc une menace pour cette espèce.



Corps entièrement noir ; longue queue ; **grande taille** (1 mètre de haut en moyenne)

# Près

Rolle violet


Corps violet      Bec jaune court



Bouts des ailes et queue bleues

Guêpier à gorge rouge

Bec fin et arqué      Ailes vertes



Bas-ventre bleu

Longue queue

Grand indicateur

Bec rose      Tache jaune à l'épaule ;  
Joue blanche      Ailes tachetées de blanc



Gorge noire

Le jeune a la gorge jaune et le bec sombre

Martinet des palmiers

**Vol rapide, souvent autour des palmiers rôniers**

Corps entièrement gris-brun




Ailes étroites et longue queue terminées en pointe

# de l'eau

Pluvian d'Égypte

Ailes et queue gris clair      Dos et collier noir



Longues pattes grises

Court bec gris

Ombrette d'Afrique

Corps entièrement gris-brun      Huppe



Longues pattes sombres

Long bec sombre

Alcyon pie

Ailes et dos noirs rayés de blanc      Long bec sombre




Pattes courtes

Queue noire

Jacana à poitrine dorée

Bec et front gris-bleuté      Corps brun-roux



Poitrine dorée

Longues pattes grises avec de longs doigts



# Les petits

## Epervier shikra

### Mâle adulte

Tête, queue et dos gris clair uni

Œil rouge



Longues pattes jaunes

Gorge striée de roux ;  
Ventre blanc pur

### Femelle et immature

Dos gris sombre,  
aspect plus terne



Ventre tacheté de roux

En vol, ailes courtes et  
larges  
=> Aspect petit et massif

Petite envergure : 60  
centimètre maximum



L'envergure est la taille d'une extrémité à l'autre des ailes lorsqu'elles sont ouvertes alors que l'oiseau vole. En général, plus un oiseau est grand, plus il a une grande envergure.

## Faucon ardoisé

Corps entièrement  
gris-ardoisé

Contour de l'œil  
jaune



Pattes jaunes courtes

## Faucon chicquera

Tête rousse et  
contour de l'œil  
jaune

Gorge et  
poitrine pâles



Dos, ventre et queue gris barré de blanc

# rapaces

## Busautour des sauterelles

Chez l'adulte, l'œil est jaune  
et la tête grise-sombre ;  
Chez l'immature, l'œil est  
sombre et la tête rousse

Petite envergure : 1 mètre



Aspect général  
élancé

Ventre pâle

Longue queue

Longues pattes jaunes




En vol, les ailes paraissent  
longues et ont une teinte  
rouse aux extrémités

## Aigle fascié

Ailes  
larges  
noires et  
blanches

Poitrine blanche  
tachetée de noir




Envergure moyenne :  
1,40 mètres environ

Aspect général massif

Queue arrondie, blanche terminée par  
une bande noire


Tête sombre  
avec œil rouge




Pattes couvertes de  
plumes blanches

# Les grands

## Bateleur des savanes



## Circaète brun



## Aigle de Wahlberg



# rapaces

## Le saviez-vous ?

Les vautours sont de très grands rapaces qui se nourrissent presque exclusivement de carcasses d'animaux morts. Ce sont des charognards. Ils jouent ainsi un rôle écologique très important en nettoyant la brousse des cadavres laissés à l'abandon à l'origine d'épidémies. Mal connus et souvent chassés, les vautours sont aussi les victimes indirectes des produits vétérinaires et substances toxiques utilisés pour détruire certains animaux. 8 espèces sont présentes au Sénégal. **6 d'entre elles sont sur la liste rouge des espèces menacées et 4 sont en danger critique d'extinction en 2017.**

## Vautour charognard



**Grande envergure : 1,70 mètres minimum**

Queue courte et arrondie



## Vautour percnoptère

**Grande envergure : 1,60 mètres en moyenne**

