

Short Notes — Notes Courtes

Les premières observations de l'Alouette à queue rousse *Pinarocorys erythropygia* au Sénégal

J'ai observé l'Alouette à queue rousse *Pinarocorys erythropygia* dans la Réserve Naturelle Communautaire du Boundou pour la première fois le 10 nov 2015 au coucher du soleil. Lors de la première observation, ce passereau n'a pas été immédiatement identifié. Sa grande taille et son envol, rappelant étonnamment celui d'une Grive mauvis *Turdus iliacus*, n'étaient pas caractéristiques d'une espèce déjà connue dans la Réserve. Le lendemain, l'oiseau était toujours présent, en évidence sur une motte de terre légèrement proéminente. Elle ne s'envola pas à l'approche de notre véhicule, nous permettant une série de photos correctes (Fig. 1). Elle fut également observée de longues minutes le 12 novembre. En alerte dès notre présence, l'oiseau n'a effectué que peu d'actions, à l'exception de quelques courts déplacements (courus ou volés), sans jamais crier ni chanter.

Au sol, c'est sa taille moyenne, ses longues pattes et sa silhouette haut-perchée qui ont en priorité retenu notre attention. Ensuite, son collier et son sourcil crème, sa poitrine claire et son croupion roux permettent de préciser l'identification. Son bec court et fort est également un critère notable. Parmi les autres espèces d'Alaudidés, peu



Figure 1. Alouette à queue rousse *Pinarocorys erythropygia*, Mania Dala (Réserve Naturelle Communautaire du Boundou, Sénégal Oriental), 11 nov 2015.

atteignent cette taille remarquable, à l'exception de l'Alouette à nuque rousse *Mirafra africana*, qui se distingue de *P. erythrogygia* par un manteau écaillé et un bec plus recourbé. Les autres espèces d'alouettes de grande taille de la région étudiée sont le Sirlu du désert *Alaemon alaudipes* et l'Alouette de Clotbey *Rhamphocoris clotbey*, toutes deux facilement identifiables. Enfin, le bec assez court et trapu permet d'éliminer les différentes espèces de pipit décrites pour l'Afrique de l'Ouest (Borrow & Demey 2001). Sur le site, on pouvait notamment relever la présence de quelques Moinelettes à oreillons blancs *Eremopterix leucotis* et Cochevis modestes *Galerida modesta*. Cette observation a été enregistrée par Demey (2016), sans mention des détails.

La Réserve Naturelle Communautaire du Boundou est une aire protégée du Sénégal Oriental (Fig. 2), où 210 espèces d'oiseaux ont déjà été inventoriées (<www.reserve-boundou.com/bird_list>, consulté 15 juin 2016). Ses paysages sont majoritairement composés de savanes arbustives et arborées. Elle est ponctuellement ouverte par de petites mares temporaires, qui entraînent un défrichement autour desquelles se développent des zones herbacées. Le site de Mania Dala (14°3'24"N, 12°25'55"O) est situé en plein cœur de cette Réserve, et en est l'un des sites-clé. Il s'agit d'une zone ouverte de 2 ha, au milieu d'une vaste savane arborée, typique du Sénégal Oriental. La présence d'une mare temporaire est un atout important, et le site fait donc l'objet d'un suivi régulier. Suite aux feux de brousse précoces d'origine anthropique (mi-octobre) et à une forte pression de pâturage, la savane herbacée qui entoure la mare était couverte d'une végétation herbacée rase et sèche (Fig. 3).




Figure 2. Localisation de la Réserve Naturelle Communautaire du Boundou au Sénégal. R = site de l'observation récente; A = sites des données antérieures.



Figure 3. Mania Dala, savane herbacée brûlée au milieu d'une savane arborée (RNC du Boundou, 4 nov 2015)

L'espèce a une répartition très large, du Mali au Sud-Soudan (Borrow & Demey 2001). La Sénégambie se trouve à l'extrémité occidentale de son aire de répartition, où les observations sont rares. L'espèce n'est pas relevée dans le bilan des observations notables au Sénégal de 1984 à 1994 (Sauvage & Rodwell 1998), ni mentionnée pour le Sénégal par Borrow & Demey (2011). Il existe cependant deux observations qui n'ont pas été publiées, relevées au Parc National du Niokolo Koba, Sénégal, c. 120 km au sud-ouest de Mania Dala, l'une en février 1985 (R. Demey *in litt.* 2016), l'autre en novembre 1992 par P. Delaporte (*in litt.* 2016). Par ailleurs il y a une mention en 1961 en Gambie: "1 sujet, sans doute le même, près de Banjul 31 déc. 1960 et 1er–8 janv. 1961" (Morel & Morel 1990).

Bibliographie

- BORROW, N. & DEMEY, R. (2001) *Birds of Western Africa*. Christopher Helm, London.
- BORROW, N. & DEMEY, R. (2011) *Birds of Senegal and the Gambia*. Christopher Helm, London.
- DEMEY, R. (2016) Recent reports. *Bull. Afr. Bird Club* 23: 104–123.
- MOREL, G.J. & MOREL, M.-Y. (1990) *Les Oiseaux de Sénégambie*. ORSTOM, Paris.
- SAUVAGE, A. & RODWELL, S.P. (1998) Notable observations of birds in Senegal (excluding Parc National des Oiseaux du Djoudj), 1984–1994. *Malimbus* 20: 75–122.

Reçu 2 mai 2016; revu 1 juillet 2016

Jean DELANNOY

Chargé des suivis écologiques de la Réserve Naturelle Communautaire du Boundou,
8 rue de l'égalité, 62123 Beaumetz-les-Loges, France <jean.delannoy@gmail.com>